



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРИВООЗЕРСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Леніна, 21, смт. Криве Озеро, 55104, т/факс 2-20-57

вул. Перемоги, 31, смт. Владіївка, 56301, т/факс 9-65-66

e-mail: veterinar_kroz@ukr.net; e-mail: udss_vrad@ukr.net

ЄДРПОУ 40327023

Від 21.12.2018р. № 14.17.2/543

На № _____ від _____

Директору Кривоозерської
ЗОШ I-III ступенів № 1
Лаврик О.Г.

Відповідно до інформації щодо інфекційної захворюваності серед дітей в навчальних закладах, в Кривоозерській ЗОШ I-III ступенів № 1 з 10 по 20 грудня виявлено 19 випадків захворювання вітряною віспою серед дітей 1-4 класів. Кривоозерське міжрайонне управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області доводить до Вашого відома, що вітряна віспа це гостре інфекційне захворювання, яке супроводжується підвищенням температури тіла та плямисто-папульозно-везикулярним висипом на шкірі та слизових оболонках.

Джерелом інфекції є хворий на вітряну віспу, починаючи з 1 – 2-го дня інкубаційного періоду і до 6-го дня після останньої появи висипу. Джерелом захворювання може бути також хворий на оперізуючий лишай.

Механізм передачі при вітряній віспі повітряно-краплинний, передається на відносно далекі відстані. Внаслідок малої стійкості збудника через третю особу та предмети, з якими стикався хворий, не передається.

Сприйнятливість до вітряної віспи загальна. Хворіють діти усіх вікових груп. Переважна більшість хворих — це діти до 10 років життя. У підлітків та дорослих вітряна віспа протікає значно важче: рясні висипання, частіше спостерігаються пустульозні елементи, гарячкова реакція, виразнішими є прояви загальної інтоксикації.

Інкубаційний період при вітряній віспі триває від 11 до 21 дня, найчастіше близько 14 днів.

Вам необхідно забезпечити дотримання заходів щодо профілактики вітряної віспи в організованих колективах:

1. Хворого на вітряну віспу ізолюють вдома, якщо є покази — у стаціонарі, на 9 днів від моменту появи висипу.

2. Обмежити проведення масових заходів із скупченням дітей.
3. Обмежувальні протиепідемічні заходи в організованих колективах проводити для дітей, які були в контакті з хворим на вітряну віспу і не хворіли на вітряну віспу, термін від 11 до 21 дня від моменту контакту.
4. Проводити щоденно вологе прибирання та провітрювання приміщень.
5. За контактними у вогнищі встановлюють щоденний медичний нагляд.
6. Проводити санітарно-освітню роботу серед батьків.
7. Розробити план протиепідемічних заходів.

Про вжиті заходи надати інформацію до Кривоозерське міжрайонне управління Головного Управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області до 22.12.2018 р.

Начальник управління



Тетяна СТАХІВА

Наталя Драмарецька
0977046972

Пам'ятка для батьків

«Профілактика вітряної віспи»

Збудником вітряної віспи є вірус, а джерелом інфекції – лише людина, хвора на вітряну віспу або оперізуючий лишай.

Механізм передачі – повітряно-крапельний.

Інфекція легко переноситься на значні відстані (20 м і більше): в сусідні приміщення, з поверху на поверх по вентиляційних та інших ходах. Захворіти може людина будь-якого віку, що не має імунітету до збудника вітряної віспи. Більшість випадків захворювання спостерігається серед дітей у віці до 7 років (80%). Діти, які не відвідують дитячі освітні заклади, хворіють в шкільні роки. У дорослих вітряна віспа зустрічається рідко. Характерна сезонність – в осінньо-зимовий період захворює 70-80% дітей. Після захворювання формується стійкий імунітет. Повторні випадки вітряної віспи зустрічаються напролюд рідко.

Інкубаційний (прихований період) під час вітряної віспи в середньому складає 11-21 день.

Ознака хвороби є висип, який проходить декілька стадій розвитку: рожева пляма - папула (вузлик) – везикула (бульбашка, наповнена прозорою рідиною) –кірка. У одного й того ж хворого одночасно можна спостерігати і плями, і папули, і везикули, і кірку. Висипання виникає на шкірі тулуба, обличчя, шиї, кінцівок, крім долонь і підшов, на волосяній частині голови. Висипання може з'являтися і на слизових оболонках порожнини рота, статевих органах, особливо у дівчаток. Період висипання триває в середньому 2-10 днів. У більшості випадків захворювання протікає легко, але можуть розвиватися і тяжкі форми. У дітей до 2-х років і у дорослих може розвинутися вірусна пневмонія.

Профілактика вітряної віспи: хворого ізолюють вдома до моменту відпадання останньої кірки. Дітей, які контактують з хворим та не хворіли вітряною віспою, роз'єднують на 21 день. Якщо день контакту з хворим точно встановлено, роз'єднання проводять не відразу, а з 11-го дня після контакту. Проводяться вологе прибирання і провітрювання. Вакцин проти вітряної віспи немає.

**Кривоозерське міжрайонне управління
Головного Управління Держпродспоживслужби
в Миколаївській області**